
07 4

Ouchtata n°7

Vass4R07s021-025

alantaniha taniha taniha tani





0Mtp841

The State of the S

1. 14 A 4
Ouchtata nº 7



DESIGNATION: Ouchtata Nº 7 CLOS 1 PLANCHE /4 RANG A Souche 4 Vigueur: 2,5 FORT : éris - ½ éris - couche Hillerandage : 0 Date de Véraison : Date de Maturité : 24-9 Pourriture : 0 CRAPPE : G - H - G : D - H - C BAID : TG - G - M - @ 12×11 disc. - Sph) ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - M SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 81 1 s2 0 avec pépins apyrène 83 2 1 84 2 JUS (: inc.) coloré

Année: 1977 Emplacement ... 1.14 A4. ... Désignation / Quantate no 7

	! Nombre ! Total	!	D A T E S								
	! d'yeu	x! 7.3	10-3		!	1 1					
V	!	1	1 1	,	!	1 1					
2	! 2	10	101		!	1 1					
3	e!	1		ol o	103	1+4					
4	1 97	1 1	1 2 1	ne	!	I I					
5	! 2	: 0	1 1		ī	!!!!					

Année: 1378
Emplacement 1.14 A4 Désignation . Ouchtata nº7

	Nombre							
	Total d'yeux	13.3	!		!	!	!	
1	2	!!!	!		!	!	!	
2	94	2			1	!	1	
3	. 2	1.			!	i	1	
A.	. 2	2.	20		1	!	!	
5	! 3	3.	lle:	12.3	78	!	!	

Année : 1979

	! Nombre ! Total	DATES									
	l d'yeux	1 153	1 1	i i	1 1						
1	! !	<u>i</u>	1 1	1	i.	1 2					
2	3	1 1	1 1	į	1	2					
3	4	1 3.	1 1	4	2	ž					
4	: 4	14-	100	1	- !	1					
5	1 6	! 5 .	He 14 3 -1	²⁹ ! E	3) :	1					

AUNEE 1989

MOM Conditata net EMPLACEMENT 1. 14 A4

Southe	Nore	Débourrement début mi/dé	t Nbre	Ferti- lité		Véraison n début mi/v	Maturité
3 4	5 4 5 5		0 0 0	0			
5 Mill	6	Pourriture	0	Port :	Couche Vigue	ur : 25	

ANNEE 1991

4R7 D21 25

NOM Ouchtata Nº7

EMPLACEMENT / 1444

	**
W	

Souche	Nbre yeux	I to purcous my discount Phononical St. in Cala.	Nbre grap	Ferti-	Flo	raison mi/f	fin	Vé:	raison	fin	Maturité
	.,		. 5 2		0.017040			dende	111227	1.111	
2TL 3TL 4 5TL	7 4 9 5 10		9	ATC	: G - O TG - O disc-	7.6 +7 M-P Mil G-M Sph-el Gr-Rs- m-a	Dim 1:0 PD: 1-ov- Rg(N)	im : 1:	Compact yl-fus : (inc	2,5	25.9 + 6 (L) - M -C
				Port :		- ap		igueur	: 4		
					2				(
		-									

NOM Cuchtata No 7 EMPLACEMENT 1 14 A 4 WILLIAM WILLIAM MA T WAR A 1 21.25													
Succe	Nbre yeux	Débourrement		Ferti- Floraison Véra:					son i/v fin Maturité				
1	4		2	1	18.5	22.5	26.5	8:3	128	178	21,9		
3	3		0			0	# 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	+3		+6		
3	4		1	Grappe	: G	M - P	Dim	O P	Compa	cité	: L - M- C		
4	4		.0	Pour :	~. ~	Mil	disable or						
5	6	1	0		TC - disc-s			<u>Dim:</u> bov-cyl	l-fus				
		:	:	Couleu						- col	loré		
	4			Saveur					erb				
	1			Efrins	: ave	- ap							
		4		Post,			V	igueur	å 4				
		F.											

ANNEE: 1996
Will Buchtata no7

EMPLACEMENT. 4 17 4 21,25

1-14A4

m.		Structure of the struct												
ouche	yeux	debut	rrement mi/dob	grap	Ferti-		raison mi/f			raison mi/v	fin	Maturité		
1 2 3 4 5	2 3 4 3 2	1813 1813 11,3 1813	22.3. 22.3. 22.3. 22.3.	0	Grappe Four : Baie :	: G TC - C disc-sp r : B-C : S	M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1: - P I -ov-ol Rg-N r - fo	oim:	Compac -fus inc -	cité	: L - 1 - C		

Désignation: Gueltata 11:7
Emplacement: 1-14A4A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6) duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvots

Désignation : Emplacement :

buchtata nº 7

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 4 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 62 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 6.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLBUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calup 75

. Euchtata n ? 7

Désignation :

1- 14A4 A.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair Blace rouge foncé 4.

: coloré Oly vert 8.

(I) FLEUR

52 - bourgeon

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo75

Guchtata m ? 7 1-14A4 s. 5

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2- grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6

37 - Nervures : Face supérieure : verte O - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 25- court 3.

39 - glabre - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

No d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté No Souche

GRAPPE

2 3 4 5.

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite

24 - Lâche A) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (5.)

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8,
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5)
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7.- arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 📆
- 29 A jus incolore (1)- coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7)- molle 8.
- 30 Avec-pépins 8 apyrène 9.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 Abourrelet de couleur verte 7 rouge 8)- irrégulière 9.
- 31 A bourrelet évident peu apparent (2)
- 32 A pinceau : court (4) moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré (8) non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Calio 79

Cuchata n € 7 1-14A45-2

DEMONINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), pou ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), câtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithelle de longueur moyenne : cms. gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

```
Emplacement: cl 1 pl 14 A4
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.
9 - L1/L ..... ① - ② - ③.
10 - L<sub>2</sub>/L ...... ① - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 -(1 - 2 - 3).
16 - Dents : forme ...... (7 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... (3 - 2 - 3.
19 - Base nerv: (gar: ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
1 - 2 - (3) - (4) - (5).
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1-(2)-3.
                 Forme : 4 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

ni Désignation: Occhtata ne 7

Nº d'ordre :

Origine :